

硬膜外麻酔による分娩（和痛分娩）同意書

硬膜外無痛（和痛）分娩とは

出産に伴う痛みは背骨に守られたスペース（くも膜下腔）にある脊髄（神経）を通して脳に伝えられます。脊髄（神経）の近くの硬膜外腔にカテーテルと呼ばれる細いチューブを入れて麻酔薬を注入することにより、脳が感じる痛みを遮断する方法が硬膜外麻酔です。

方法

- ①分娩台の上で横になり、背中を丸くする。
- ②背中を消毒し、腰に局所麻酔を行った後、カテーテルを導入するための針を硬膜外腔まで進める。
- ③針を通してカテーテルを硬膜外腔に挿入し、カテーテルが硬膜外腔にしっかり入ったら針を抜く。
- ④麻酔薬を注入して痛みをとる。

麻酔がきいているので足が十分に動かないことがあるため、歩行に注意。

自分では尿をだせないことがあるため、管で尿をとることがある。

危険性

- ①低血圧（末梢の血管が開くため。低血圧の場合胎児への血流が悪くなることもある）：
定期的に血圧を測定。点滴、血圧を上げる薬を投与する。
- ②陣痛が弱くなる：分娩に時間がかかるため陣痛促進剤を使うことが多い。吸引分娩となることもある。また回旋異常が起こるといふ報告がある。帝王切開の確率は麻酔をしない時と変わらないと言われている。
- ③発熱：原因不明だが比較的良好に見られる。血液検査で感染が否定されれば慎重に経過観察する。
- ④麻酔開始後短時間に陣痛が強くなり、胎児心拍の変動が起こることがある（1～2%）ため十分に気を付けて胎児心拍をモニターする。1時間以内に強い陣痛は自然に治まり、麻酔を続けても再発はしないとされている。
- ⑤くも膜下（硬膜外より奥にはいってしまう）注入
頭痛：鎮痛剤投与、安静、点滴（治るまでに数日かかる）
（全脊椎麻酔となった場合は麻酔器による管理を行うことがある）
- ⑥局所麻酔薬によるアレルギー：症状に応じて投薬、薬の使用中止
- ⑦出血、感染（硬膜外血腫、膿瘍）

穿刺後時間がたってから背部に強い痛みが出てくる、下肢のしびれが強くて治らない場合、専門診療科の診察を依頼することがある。

なお、費用として50,000円かかります。（緊急に行う場合、休日及び深夜は90,000円、当院の表示する診療時間以外の時間は70,000円となります。）

説明年月日：

説明医師 産婦人科

同席者

上記の診療行為について、その内容、方法、危険性、料金などの説明を受け、十分理解納得しましたので、この診療行為を受けることに同意します。

京都済生会病院 病院長 殿

.....年.....月.....日.....

本 人 氏名（自署）.....

配偶者または保護者 氏名（自署）.....（続柄.....）