

レジメン名称

[胆道:\(42\)ゲムシタビン療法](#)

[胆道:\(79\)ゲムシタビン + S-1療法](#)

[胆道:\(168\)ゲムシタビン + CDDP\(GC\)療法](#)

[胆道:\(356\)ゲムシタビン + CDDP+S-1\(GCS\)療法](#)

胆道がん:(42)ゲムシタビン療法

						Day																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg100mL	点滴	15分間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	15分間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL	点滴	30分間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL	点滴	全開	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

胆道がん: (79)ゲムシタビン+S-1療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	グラニセトロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg/100mL	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg/1管	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤	1. 25m ² 未満40mg/回 1. 25m ² 以上~1.5m ² 未満50mg/回 1. 5m ² 以上60mg/回	経口	分2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

胆道がん:(168)ゲムシタビン+CDDP(GC)療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	Day																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ソリタ-T1号	開始液(1)	500mL	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
2	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg*2A	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
2	ファモチジン注	ファモチジン	20mg1A	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
2	アロキシ点滴静注バッグ	パロノセトロン	50ml	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
3	ランダ注	シスプラチン	25mg/m ²	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
4	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
5	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	500mL1袋	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
6	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	500mL1袋	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
7	イメドカプセル	アプレピタント	125mg	経口	CDDP投与1時間前Day1	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
8	イメドカプセル	アプレピタント	80mg	経口	午前中Day2&3	-	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●			