

## レジメン名称

乳腺:(15)ドセタキセル療法  
 乳腺:(16)ビンレルビン療法  
 乳腺:(17)FEC100療法  
 乳腺:(18)weekly-パクリタキセル療法  
 乳腺:(19)HER(毎週投与・初回)療法  
 乳腺:(19)HER(毎週投与・2クール目以降)療法  
 乳腺:(20)weekly-パクリタキセル + HER(初回)療法  
 乳腺:(20)weekly-パクリタキセル + HER(2クール目以降)療法  
 乳腺:(31)HER(3週間毎・初回)療法  
 乳腺:(31)HER(3週間毎・2回目以降)療法  
 乳腺:(85)EC(100)療法  
 乳腺:(93)FEC100(アプレピタント + パロノセトロン)療法  
 乳腺:(112)nab-パクリタキセル療法  
 乳腺:(113)パクリタキセル + HER療法(初回)  
 乳腺:(113)パクリタキセル + HER療法(2クール目以降)  
 乳腺:(114)TC療法  
 乳腺:(117)nab-パクリタキセル + HER(初回)療法  
 乳腺:(117)nab-パクリタキセル + HER(2クール目以降)療法  
 乳腺:(119)ドセタキセル + HER(初回)療法  
 乳腺:(119)ドセタキセル + HER(2クール目以降)療法  
 乳腺:(124)TCH(初回)療法  
 乳腺:(124)TCH(2クール目以降)療法  
 乳腺:(125)TCH療法(2クール目以降)  
 乳腺:(133)weekly-パクリタキセル + ペバシズマブ療法  
 乳腺:(142)カペシタビン + HER(初回)療法  
 乳腺:(142)カペシタビン + HER(2クール目以降)療法  
 乳腺:(157)エリブリン療法  
 乳腺:(159)エリブリン + HER(初回)療法  
 乳腺:(159)エリブリン + HER(2クール目以降)療法  
 乳腺:(165)ゲムシタビン療法  
 乳腺:(177)フルベストラント療法  
 乳腺:(179)ゲムシタビン + HER(初回)療法  
 乳腺:(179)ゲムシタビン + HER(2クール目以降)療法  
 乳腺:(187)ドセタキセル + HER + PER(初回)療法  
 乳腺:(187)ドセタキセル + HER + PER(2クール目以降)療法  
 乳腺:(196)トラスツズマブエムタンシン療法  
 乳腺:(209)HER + PER(初回)療法  
 乳腺:(209)HER + PER(2クール目以降)療法  
 乳腺:(223)EC(90)療法  
 乳腺:(224)HER + PER + エリブリン(初回)療法  
 乳腺:(224)HER + PER + エリブリン(2クール目以降)療法  
 乳腺:(242)HER + PER + PAC(初回)療法  
 乳腺:(242)HER + PER + PAC(2クール目以降)療法  
 乳腺:(312)アテゾリズマブ+nab-PTX療法  
 乳腺:(313)トラスツズマブ デルクステカン療法  
 乳腺:(327)dose-dense EC(90;600)療法  
 乳腺:(328)weekly-パクリタキセル(80)療法  
 乳腺:(331)dose-denseパクリタキセル(175)療法  
 乳腺:(352)ペムブロリズマブ+GEM+CBDCA療法  
 乳腺:(353)ペムブロリズマブ+nab-PTX療法  
 乳腺:(354)ペムブロリズマブ+PTX療法

## 乳がん:(15)ドセタキセル療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	70mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分以上	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL	点滴	60分以上	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 乳がん:(17)FEC100療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセトン3mg/バッグ	塩酸グラニセトン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ファルモルピシンRTU注射液50mg	塩酸エピルピシン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	始めはゆっくり、全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	始めはゆっくり、全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5-FU注250協和	フルオロウラシル	500mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	イメンド	アプレピタント	125mg	経口	EP開始60分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
7	イメンド	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
8	デカドロン	デキサメタゾン	8mg	経口	分2	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-

## 乳がん：(18)weekly-パクリタキセル療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg5錠	経口	PTX開始30分前	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ファモチジン注	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

※6週間連続し2週間休薬

## 乳がん：(19)HER(毎週投与・初回)継続療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	4mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# 乳がん:(19)HER(毎週投与・2回目以降)継続療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	2mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-

## 乳がん: (20)Weekly-パクリタキセル+HER(初回)療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	4mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	2mg/kg	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg5錠	経口		●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	ファモチジン注	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	グラニセロン3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	タキソール	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-

※HERは毎週、PTXは6投2休



## 乳がん：(20)Weekly-パクリタキセル+HER(2回目以降)療法

					Day																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	2mg/kg	点滴	90-30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	90-30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg5錠	経口		●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	ファモチジン注	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	グラニセロン3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	タキソール	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

# 乳がん：(31)HER(3週間毎・初回)療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	8mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚蒸留水	大塚蒸留水	20mLのうち7.2mL	点滴	90-30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

## 乳がん：(31)HER(3週間毎・2回目以降)療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	トラスツズマ ブ注射用150	トラスツズマ ブ(遺伝子組 換え)	6mg/kg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚蒸留水	大塚蒸留水	20mLのう ち7.2mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15 分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 乳がん: (93)FEC100+(アプレピタント+パロノセトロン)療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	イメドカプセル	125mg	125mg1カプセル	経口	EP前1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	イメドカプセル	80mg	80mg1カプセル	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
3	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	パロノセトロン静注用バッグ	0.75mg	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	エピルピシンRTU注射液50mg	塩酸エピルピシン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	ゆっくり→全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	ゆっくり→全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5-FU注250協和	フルオロウラシル	500mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
7	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
7	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

## 乳がん:(112)nab-パクリタキセル療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	アブラキサン 点滴用100mg	パクリタキセル 100mg	260~180 mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



# 乳がん:(113)パクリタキセル+HER療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	タキソール	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

# 乳がん:(114)TC療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	パロノセトロン静注バッグ	パロノセトロン	50ml	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	テルモ生食	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	デカドロン錠	デキサメタゾン	8mg/日	経口	分2	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-



## 乳がん:(117)nab-パクリタキセル+HER(初回)療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	初回8mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	アブラキサ	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 乳がん:(117)nab-パクリタキセル+HER(2回目以降)療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	60分~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	アブラキサン	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

## 乳がん:(119)ドセタキセル+HER(初回)療法

						Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	初回8mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	2回目~6mg/kg	点滴	60~30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60~30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分以上	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分以上	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 乳がん:(119)ドセタキセル+HER(2回目以降)療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	2回目~6mg/kg	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分以上	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分以上	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





# 乳がん: (133)weeklyパクリタキセル+ベバシズマブ療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	Day																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg 2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ファモチジン注射液	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	10mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg*5錠	経口		●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	

# 乳がん:(142)カペシタビン+HER併用療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	8mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	カペシタビン錠300	カペシタビン300mg		経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



# 乳がん:(142)カペシタビン+HER併用療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ハーセプチン 注射用150	トラスツズマ ブ(遺伝子組 換え)	6mg/kg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15 分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	カペシタビン 錠300	カペシタビン 300mg		経口	朝夕食後	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## 乳がん:(157)エリブリン療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ハラヴェン	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-



### 乳がん:(159)エリブリン+HER(2回目以降)療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	テルモ生食	生理食塩液	50mL1袋	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	ハラヴェン	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

# 乳がん:(179)ゲムシタビン+HER(初回)療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	Day																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●		
2	トラスツマブ注射用150	トラスツマブ(遺伝子組換え)	1000mg/kg2回目を以降6mg/	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	トラスツマブ注射用150	トラスツマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-			
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●			
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●			
6	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●			

## 乳がん:(179)ゲムシタビン+HER(2回目以降)療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	60-30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60-30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1250mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●

## 乳がん:(187)ドセタキセル+HER+PER(初回)療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	パージェタ	ペルツズマブ	840mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	パージェタ	ペルツズマブ	420mg2V ⇒1V	点滴	30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	8mg/kg ⇒6mg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	60~30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60~30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg 1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	グラニセロンバッグ3mg	グラニセロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 乳がん:(187)ドセタキセル+HER+PER(2回目以降)療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	パージェタ	ペルツズマブ	420mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	デキササート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg 1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	グラニセロンバッグ	グラニセロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-





## 乳癌：(209)HER+PER(初回)療法

						Day																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	パージェタ	ペルツズマブ	840mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	パージェタ	ペルツズマブ	420mg	点滴	30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ハーセプチン 注射用150	トラスツスマブ(遺伝子組換え)	8mg/kg ⇒6mg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ハーセプチン 注射用150	トラスツスマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	60~30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60~30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 乳がん: (209)HER+PER(2回目以降)療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	パージェタ	ペルツズマブ	420mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	トラスツスマブ注射用150	トラスツスマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 乳がん: (224)HER+PER+エリブリン(初回)療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	Day																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	パージェタ	ペルツズマブ	840mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	8mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 乳がん: (224)HER+PER+エリブリン(2回目以降)療法

						Day																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
2	パージェタ	ペルツズマブ	420mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

## 乳がん: (242)HER+PER+PAC(初回)療法

						Day																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	パージェタ	ペルツズマブ	840mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	テルモ生食	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	8mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	レスタミン錠	ジフェンヒドラミン	5錠	経口		●							●							●						●										●		
6	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●							●							●						●											●	
6	ファモチジン注	ファモチジン	50mg1管		全開(15分以内)	●							●							●						●											●	
6	グラニセロン注	グラニセロン	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	タキソール注	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

# 乳がん: (242)HER+PER+PAC(2回目以降)療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	パージェタ	ペルツズマブ	420mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	レスタミン錠	ジフェンヒドラミン	10mg 5錠	経口	タキソール開始30分前	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	ファモチジン注	ファモチジン	50mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	グラニセロン注	グラニセロン	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	テルモ生食注	生理食塩液	100mL1瓶	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	タキソール注	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
9	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-



# 乳がん: (312)アテゾリズマブ+nab-PTX療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	Day																															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	テセントリク	アテゾリズマブ	840mg	点滴	60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	アブラキサン注	nab-パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

# 乳がん：(313)トラスツズマブ デルクステカン療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	パロノセトロン点滴静注用	パロノセトロン塩酸塩	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	デキサート注射液	デキサメタゾン	3.3mg/1mL×3	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5%大塚糖液	ブドウ糖	100mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	エンハーツ点滴静注用100mg*	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	点滴	* 90-30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5%大塚糖液	ブドウ糖	250mL-150mLとし全量を100mLとして使用する.	点滴	* 90-30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5%大塚糖液	ブドウ糖	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

\*初回90分、忍容性があれば2回目以降は30分に短縮することができる \*エンハーツは遮光すること





# 乳がん: (331) dose-denseパクリタキセル(175)療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ファモチジン注	ファモチジン	20mg/20mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg5錠	経口	PTX開始30分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴	180分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	180分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

※2週を1サイクルとして通常4サイクル

## 乳がん: (352) ペムブロリズマブ+GEM+CBDCA療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	パロノセトロンバッグ	パロノセトロン	0.75mg/50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	デキサート注射液	デキサメタゾン	3.3mg*2	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	5%大塚糖液	大塚糖液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	ジェムザール	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	5%大塚糖液	大塚糖液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	パラプラチン	カルボプラチン	AUC=2	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	5%大塚糖液	大塚糖液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-



## 乳がん: (354) ペムブロリズマブ+PTX療法

					Day																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	大塚食塩液	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	ファモチジン	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg2A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分間	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚食塩液	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	タキソール注	ハフリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

\* キイトルーダは3週ごと タキソールは3投1休 (合せて12週を1クールとする)