

## レジメン名称

[大腸:\(8\)FOLFOX4\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(9\)m-FOLFOX6\(外来\)療法](#)  
[大腸:\(10\)m-FOLFOX6\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(11\)m-FOLFOX6 + ベバシズマブ\(外来\)療法](#)  
[大腸:\(12\)FOLFIRI + ベバシズマブ\(外来\)療法](#)  
[大腸:\(13\)FOLFIRI\(外来\)療法](#)  
[大腸:\(14\)I-LV + 5-FU\(6投2球\)](#)  
[大腸:\(54\)FOLFIRI + セツキシマブ\(初回\)療法](#)  
[大腸:\(54\)FOLFIRI + セツキシマブ\(2クール目以降\)療法](#)  
[大腸:\(55\)セツキシマブ単独\(初回\)療法](#)  
[大腸:\(55\)セツキシマブ単独療法\(2クール目以降\)](#)  
[大腸:\(62\)CPT-11 + セツキシマブ\(初回\)療法](#)  
[大腸:\(62\)CPT-11 + セツキシマブ\(2クール目以降\)療法](#)  
[大腸:\(96\)パニツムマブ単独療法](#)  
[大腸:\(98\)FOLFIRI + パニツムマブ\(外来\)療法](#)  
[大腸:\(99\)m-FOLFOX6 + ベバシズマブ\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(103\)CapeOX + ベバシズマブ療法](#)  
[大腸:\(104\)CPT-11単独\(B法2投\)療法](#)  
[大腸:\(104\)CPT-11単独\(B法3投\)療法](#)  
[大腸:\(109\)CPT-11 + S-1療法](#)  
[大腸:\(147\)FOLFIRI\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(153\)CapeOX療法](#)  
[大腸:\(160\)CAPIRI + セツキシマブ療法](#)  
[大腸:\(169\)m-FOLFOX6 + パニツムマブ\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(197\)FOLFIRI + ベバシズマブ\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(204\)カペシタビン + ベバシズマブ療法](#)  
[大腸:\(205\)FOLFIRI + セツキシマブ\(初回\)\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(206\)FOLFIRI + セツキシマブ\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(215\)m-FOLFOX6 + パニツムマブ\(外来\)療法](#)  
[大腸:\(219\)FOLFIRI + ラムシルマブ\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(221\)FOLFIRI + ラムシルマブ\(外来\)療法](#)  
[大腸:\(231\)TAS-102 + ベバシズマブ併用療法](#)  
[大腸:\(238\)SIRB療法](#)  
[大腸:\(246\)CAPIRI + ベバシズマブ療法](#)  
[大腸:\(247\)SOX療法](#)  
[大腸:\(251\)FOLFIRI + アフリベリセプトβ\(外来\)療法](#)  
[大腸:\(252\)FOLFIRI + アフリベリセプトβ\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(271\)FOLFIRI + パニツムマブ\(入院\)療法](#)  
[大腸:\(279\)UFT/LV + ベバシズマブ療法](#)  
[大腸:\(280\)S-1 + ベバシズマブ療法](#)  
[大腸:\(291\)FOLFOXIRI+B-mab\(入院\)導入療法](#)  
[大腸:\(292\)FOLFOXIRI+B-mab\(入院\)維持療法](#)  
[大腸:\(293\)FOLFOXIRI+B-mab\(外来\)導入療法](#)  
[大腸:\(294\)FOLFOXIRI+B-mab\(外来\)維持療法](#)  
[大腸:\(295\)m-FOLFOXIRI+B-mab\(入院\)導入療法](#)  
[大腸:\(296\)m-FOLFOXIRI+B-mab\(入院\)維持療法](#)  
[大腸:\(297\)m-FOLFOXIRI+B-mab\(外来\)導入療法](#)  
[大腸:\(298\)m-FOLFOXIRI+B-mab\(外来\)維持療法](#)  
[大腸:\(299\)FOLFOXIRI\(入院\)導入療法](#)  
[大腸:\(300\)FOLFOXIRI\(入院\)維持療法](#)  
[大腸:\(301\)FOLFOXIRI\(外来\)導入療法](#)  
[大腸:\(302\)FOLFOXIRI\(外来\)維持療法](#)  
[大腸:\(303\)m-FOLFOXIRI\(入院\)導入療法](#)  
[大腸:\(304\)m-FOLFOXIRI\(入院\)維持療法](#)  
[大腸:\(305\)m-FOLFOXIRI\(外来\)導入療法](#)  
[大腸:\(306\)m-FOLFOXIRI\(外来\)維持療法](#)  
[大腸:\(310\)エンコラフェニブ+ピニメチニブ+セツキシマブ療法\(初回\)](#)  
[大腸:\(310\)エンコラフェニブ+ピニメチニブ+セツキシマブ療法\(2回目以降\)](#)  
[大腸:\(311\)エンコラフェニブ+セツキシマブ療法\(初回\)](#)  
[大腸:\(311\)エンコラフェニブ+セツキシマブ療法\(2回目以降\)](#)  
[大腸:\(357\)HER+PER療法\(初回\)](#)  
[大腸:\(358\)HER+PER療法\(2回目以降\)](#)









## 大腸がん: (12)FOLFIRI+ベバシズマブ(外来)療法

DAY

| 順 | 薬                           | 成分                 | 投与量                   | ルート | 投与時間          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | アバステチン点滴静注用<br>400mg/16mL   | ベバシズマブ<br>(遺伝子組換え) | 10mg/kg               | 点滴  | 1回目90分、2回目60分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |
| 1 | 大塚生食注                       | 生理食塩液              | 100mL                 | 点滴  | 同上            | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 2 | グラニセロン3mg/バッグ               | 塩酸グラニセロン           | 3mg50mL               | 点滴  | 全開(15分以内)     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 2 | デキサート注射液                    | リン酸デキサメタゾンナトリウム    | 3.3mg2管               | 点滴  | 全開(15分以内)     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | トポテシン注                      | 塩酸イリノテカン           | 150mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 90分           | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | 大塚糖液5%                      | ブドウ糖               | 250mL                 | 点滴  | 90分           | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | レボホリナート点滴静注用<br>100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム       | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 120分          | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | 大塚糖液5%                      | ブドウ糖               | 250mL                 | 点滴  | 120分          | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 5 | 5-FU注250協和                  | フルオロウラシル           | 400mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 全開(15分以内)     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 5 | 大塚糖液5%                      | ブドウ糖               | 50mL                  | 点滴  | 全開(15分以内)     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 6 | 5-FU注250協和                  | フルオロウラシル           | 2400mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 46h           | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 6 | 大塚生食注                       | 生理食塩液              | 50mL                  | 点滴  | 46h           | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |





## 大腸がん: (54) FOLFIRI+セツキシマブ(2クール目以降)療法

DAY

| 順 | 薬                       | 成分              | 投与量                       | ルート | 投与時間         | DAY |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----|--------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
|   |                         |                 |                           |     |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
| 1 | 大塚生食注                   | 生理食塩液           | 50mL                      | 点滴  | 全開(15分以内)    | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |   |   |
| 1 | ポララミン注5mg               | マレイン酸クロルフェニラミン  | 1mL                       | 点滴  | 全開(15分以内)    | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |   |   |
| 1 | デキサート注射液                | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 1管                        | 点滴  | 全開(15分以内)    | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |   |   |
| 2 | アービタックス                 | セツキシマブ          | 2回目以後250mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | (初回)120分→60分 | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |   |   |
| 2 | 大塚生食注                   | 生理食塩液           | 250ml                     | 点滴  | 同上           | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |   |   |
| 3 | 大塚生食注                   | 生理食塩液           | 50mL                      | 点滴  | 15分以上        | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |   |   |
| 4 | グラニセトン3mg/バッグ           | 塩酸グラニセトン        | 3mg50mL                   | 点滴  | 全開(15分以内)    | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |   |
| 5 | トポテシン注                  | 塩酸イリノテカン        | 150mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 90分          | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |   |
| 5 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 250mL                     | 点滴  | 90分          | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |   |
| 6 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム    | 200mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 120分         | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |   |
| 6 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 250mL                     | 点滴  | 120分         | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 7 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル        | 400mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 15分          | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 7 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 50mL                      | 点滴  | 15分          | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 8 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル        | 2400mg/m <sup>2</sup>     | 点滴  | 46h          | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 8 | 大塚生食注                   | 生理食塩液           | 50mL                      | 点滴  | 46h          | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |



## 大腸がん: (55)セツキシマブ単独(2回目以降)療法

DAY

| 順 | 薬             | 成分              | 投与量                      | ルート | 投与時間      | DAY |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---------------|-----------------|--------------------------|-----|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |               |                 |                          |     |           | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL                     | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 1 | ポララミン注5mg     | マレイン酸クロルフェニラミン  | 0.5%1mL1管                | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 1 | デキサート注射液      | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 3.3mg1管                  | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 2 | アービタックス注100mg | セツキシマブ          | (以後)250mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 120分→60分  | -   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 2 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL                    | 点滴  | 120分→60分  | -   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 3 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL                     | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |

# 大腸がん: (98)FOLFIRI+パニツムマブ(外来)療法

DAY

| 順 | 薬                       | 成分              | 投与量                   | ルート | 投与時間      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | デキサート注射液                | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 3.3mg管                | 点滴  | 全開(15分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |
| 1 | グラニセロン点滴静注用3mgバッグ       | 塩酸グラニセロン        | 3mg50mL1袋             | 点滴  | 全開(15分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 2 | 大塚生食注                   | 生理食塩液           | 50mL1瓶                | 点滴  | 全開        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | ベクティビックス注               | パニツムマブ          | 6mg/kg                | 点滴  | 60分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | テルモ生食                   | 生理食塩液           | 100mL                 | 点滴  | 60分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | 大塚生食注                   | 生理食塩液           | 50mL                  | 点滴  | 全開        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 5 | トポテシン注                  | 塩酸イリノテカン        | 150mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 90分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 5 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 5%250mL               | 点滴  | 90分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 6 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム    | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 120分      | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 6 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 5%250mL               | 点滴  | 120分      | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 7 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル        | 400mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 15分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 7 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 5%50mL                | 点滴  | 15分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 8 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル        | 2400mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 46h       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 8 | 大塚生食注                   | 生理食塩液           | 100mL                 | 点滴  | 46h       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |

# 大腸がん: (99)m-FOLFOX6+ベバシズマブ(入院)療法

DAY

| 順 | 薬                                   | 成分                      | 投与量                       | ルート | 投与時間       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 大塚生食注<br>50mL                       | 生理食塩液                   | 50mL                      | 点滴  | プライミ<br>ング | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |
| 2 | アバスチン点<br>滴静注用<br>400mg/16mL        | ベバシズマブ<br>(遺伝子組換え)      | 10mg/kg                   | 点滴  | 1回目90分     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 2 | テルモ生食                               | 生理食塩液                   | 100mL                     | 点滴  | 1回目90分     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | グラニセトロ<br>ン3mg/バッグ                  | 塩酸グラニセ<br>トロン           | 3mg50mL                   | 点滴  | 全開(15分以内)  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | デキサート注<br>射液                        | リン酸デキサ<br>メタゾンナトリ<br>ウム | 3.3mg1管                   | 点滴  | 全開(15分以内)  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | オキサリプラ<br>チン注射用<br>100mg            | オキサリプラ<br>チン            | 85mg/m <sup>2</sup>       | 点滴  | 120分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | 大塚糖液5%                              | ブドウ糖                    | 5%250mL                   | 点滴  | 120分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 5 | レボホリナー<br>ト点滴静注用<br>100mg「ヤク<br>ルト」 | レボホリナー<br>トカルシウム        | 200mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 120分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 5 | 大塚糖液5%                              | ブドウ糖                    | 5%250mL                   | 点滴  | 120分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 6 | 5-FU注250<br>協和                      | フルオロウラ<br>シル            | 400mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 15分以<br>内  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 6 | 大塚糖液5%                              | ブドウ糖                    | 5%50mL                    | 点滴  | 15分以<br>内  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 7 | 5-FU注250<br>協和                      | フルオロウラ<br>シル            | 1200mg/<br>m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h        | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | ● |
| 7 | 大塚糖液5%                              | ブドウ糖                    | 5%500mL                   | 点滴  | 23h        | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | ● |
| 8 | 大塚生食注                               | 生理食塩液                   | 50mL                      | 点滴  | 全開(15分以内)  | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |

# 大腸がん: (103) CapeOX+ベバシズマブ療法

DAY

| 順 | 薬                        | 成分                 | 投与量                            | ルート | 投与時間                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 大塚生食注                    | 生理食塩液              | 50mL                           | 点滴  | プライミング                     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |   |
| 2 | アバサチン点滴静注用<br>400mg/16mL | ベバシズマブ<br>(遺伝子組換え) | 7.5mg/kg                       | 点滴  | 1回目90分<br>2回目60分<br>3回目30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |   |
| 2 | テルモ生食                    | 生理食塩液              | 100mL                          | 点滴  | 1回目90分<br>2回目60分<br>3回目30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |   |
| 3 | デキサート注射液                 | リン酸デキサメタゾンナトリウム    | 3.3mg1管                        | 点滴  | 全開(15分以内)                  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |   |
| 3 | パロノセトロン注射液               | パロノセトロン            | 0.75mg<br>50mL                 | 点滴  | 全開(15分以内)                  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |   |
| 4 | エルブラット注射液<br>100mg       | オキサリプラチン           | 130mg/m <sup>2</sup>           | 点滴  | 120分                       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |   |
| 4 | 大塚糖液5%                   | ブドウ糖               | 5%250mL                        | 点滴  | 120分                       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |   |
| 5 | 大塚糖液5%                   | ブドウ糖               | 5%50mL                         | 点滴  | 全開(15分以内)                  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |   |
| 6 | カペシタビン錠300               | カペシタビン<br>300mg    | 2000mg/<br>m <sup>2</sup> /day | 経口  | 分2                         | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● |







## 大腸がん: (153) CapeOX療法

DAY

| 順 | 薬                    | 成分              | 投与量                        | ルート | 投与時間      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|----------------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | デキサート注射液             | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 3.3mg1管                    | 点滴  | 全開(15分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 1 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg | パロノセトロン         | 0.75mg50mL1袋               | 点滴  | 全開(15分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 2 | オキサリプラチン注射用100mg     | オキサリプラチン        | 130mg/m <sup>2</sup>       | 点滴  | 120分      | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 2 | 大塚糖液5%               | ブドウ糖            | 5%250mL1袋                  | 点滴  | 120分      | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 3 | 大塚糖液5%               | ブドウ糖            | 5%50mL1瓶                   | 点滴  | 全開(15分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 4 | カペシタビン錠300           | カペシタビン          | 2000mg/m <sup>2</sup> /day | 経口  | 分2        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● |

## 大腸がん:(160)XELIRI+セツキシマブ療法

DAY

| 順 | 薬                           | 成分                      | 投与量                       | ルート | 投与時間          | DAY |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |                             |                         |                           |     |               | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ポララミン注<br>5mg               | マレイン酸ク<br>ロルフェニラミ<br>ン  | 0.5%1mL1<br>管             | 点滴  | 全開(15<br>分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 1 | デキサート注<br>注射液               | リン酸デキサ<br>メタゾンナトリ<br>ウム | 3.3mg2管                   | 点滴  | 全開(15<br>分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |    |
| 1 | 大塚生食注                       | 生理食塩液                   | 50mL1瓶                    | 点滴  | 全開(15<br>分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |    |
| 2 | アービタック<br>ス                 | セツキシマブ                  | 500mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 120分          | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |    |
| 2 | 大塚生食注                       | 生理食塩液                   | 250mL1袋                   | 点滴  | 120分          | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |    |
| 3 | 大塚生食注                       | 生理食塩液                   | 50mL1瓶                    | 点滴  | 15分           | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |    |
| 4 | グラニセトロ<br>ン点滴静注<br>用3mg/バッグ | 塩酸グラニセ<br>トロン           | 3mg50mL1<br>袋             | 点滴  | 全開(15<br>分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |    |
| 5 | トポテン注                       | 塩酸イリノテ<br>カン            | 150mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 90分           | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |    |
| 5 | 大塚生食注                       | 生理食塩液                   | 500mL1瓶                   | 点滴  | 90分           | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |    |
| 6 | 大塚生食注                       | 生理食塩液                   | 50mL1瓶                    | 点滴  | 全開(15<br>分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |    |
| 7 | カペシタピン<br>錠300              | カペシタピン                  | 2000mg/<br>m <sup>2</sup> | 経口  | 分2朝夕<br>食後    | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |

# 大腸がん：(204)カペシタビン+ベバシズマブ療法

DAY

| 順 | 薬                        | 成分                 | 投与量                            | ルート | 投与時間                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 大塚生食注                    | 生理食塩液              | 50mL                           | 点滴  | プライミング                     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 2 | アバスチン点滴静注用<br>400mg/16mL | ベバシズマブ<br>(遺伝子組換え) | 7.5mg/kg                       | 点滴  | 1回目90分<br>2回目60分<br>3回目30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 2 | テルモ生食                    | 生理食塩液              | 100mL                          | 点滴  | 1回目90分<br>2回目60分<br>3回目30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 3 | 大塚生食注                    | 生理食塩液              | 50mL                           | 点滴  | 全開(15分以内)                  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 4 | カペシタビン錠300               | カペシタビン<br>300mg    | 2000mg/<br>m <sup>2</sup> /day | 経口  | 分2                         | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● |

## 大腸がん: (215)m-FOLFOX+パニツムマブ(外来)療法

DAY

| 順 | 薬                       | 成分              | 投与量                   | ルート | 投与時間      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | デキサート注射液                | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 3.3mg 1管              | 点滴  | 全開(15分以内) | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 1 | グラニセロン点滴静注用3mgバッグ       | 塩酸グラニセロン        | 3mg50mL1袋             | 点滴  | 全開(15分以内) | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 2 | 大塚生食注                   | 生理食塩液           | 50mL1瓶                | 点滴  | 全開        | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 3 | ベクティビックス                | パニツムマブ          | 6mg/kg                | 点滴  | 60分       | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 3 | テルモ生食                   | 生理食塩液           | 100mL1袋               | 点滴  | 60分       | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 4 | 大塚生食注                   | 生理食塩液           | 50mL1瓶                | 点滴  | 全開        | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 5 | オキサリプラチン注射用100mg        | オキサリプラチン        | 85mg/m <sup>2</sup>   | 点滴  | 120分      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 5 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 5%250mL1袋             | 点滴  | 120分      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 6 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム    | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 120分      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 6 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 5%250mL1袋             | 点滴  | 120分      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 7 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル        | 400mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 15分以内     | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 7 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 5%50mL1瓶              | 点滴  | 15分以内     | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 8 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル        | 2400mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 46時間      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |
| 8 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖            | 5%100mL1袋             | 点滴  | 46時間      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● |





## 大腸がん: (231)TAS102+ベバシズマブ療法

DAY

| 順 | 薬                        | 成分                 | 投与量                    | ルート | 投与時間      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 大塚生食注                    | 生理食塩液              | 50mL1瓶                 | 点滴  | プライミング    | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |
| 2 | アパスチン点滴静注用<br>400mg/16mL | ベバシズマブ<br>(遺伝子組換え) | 5mg/kg                 | 点滴  | 90~30分    | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 2 | テルモ生食                    | 生理食塩液              | 100mL1袋                | 点滴  | 90~30分    | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | 大塚生食注                    | 生理食塩液              | 50mL1瓶                 | 点滴  | 全開(15分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | ロンサーフ                    | TAS102             | 35mg/m <sup>2</sup> /回 | 経口  | 朝夕食後      | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | ● |







## 大腸がん：(251)FOLFIRI+アフリベルセプトベータ(外来)療法

DAY

| 順 | 薬                               | 成分               | 投与量                       | ルート | 投与時間          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 大塚生食注                           | 生理食塩液            | 50mL                      | 点滴  | プライミング        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 2 | ザルトラップ<br>点滴静注用                 | アフリベルセプト(遺伝子組換え) | 4mg/kg                    | 点滴  | 60分           | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 2 | 大塚生食注                           | 生理食塩液            | 100mL                     | 点滴  | 同上            | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | パロノセトロン<br>0.75mg<br>パック        | パロノセトロン          | 0.75mg50<br>mL            | 点滴  | 全開(15<br>分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | デキサート注<br>射液                    | リン酸デキサメタゾンナトリウム  | 3.3mg2管                   | 点滴  | 全開(15<br>分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | トポテシン注                          | 塩酸イリノテカン         | 150mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 90分           | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | 大塚糖液5%                          | ブドウ糖             | 250mL                     | 点滴  | 90分           | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 5 | レボホリナート<br>点滴静注用<br>100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム     | 200mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 120分          | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 5 | 大塚糖液5%                          | ブドウ糖             | 250mL                     | 点滴  | 120分          | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 6 | 5-FU注250<br>協和                  | フルオロウラシル         | 400mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 全開(15<br>分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 6 | 大塚糖液5%                          | ブドウ糖             | 50mL                      | 点滴  | 全開(15<br>分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 7 | 5-FU注250<br>協和                  | フルオロウラシル         | 2400mg/<br>m <sup>2</sup> | 点滴  | 46h           | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 7 | 大塚生食注                           | 生理食塩液            | 50mL                      | 点滴  | 46h           | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |

# 大腸がん: (252) FOLFIRI+アフリベルセプトベータ(入院)療法

DAY

| 順 | 薬                       | 成分               | 投与量                   | ルート | 投与時間      | DAY |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|-------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|   |                         |                  |                       |     |           | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
| 1 | 大塚生食注                   | 生理食塩液            | 50mL                  | 点滴  | プライミング    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 2 | ザルトラップ<br>点滴静注用         | アフリベルセプト(遺伝子組換え) | 4mg/kg                | 点滴  | 60分       | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 2 | 大塚生食注                   | 生理食塩液            | 100mL                 | 点滴  | 同上        | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 3 | アロキシ0.75mgパック           | パロノセトロン          | 0.75mg100mL           | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 3 | デキサート注射液                | リン酸デキサメタゾンナトリウム  | 3.3mg2管               | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 4 | トポテシ注                   | 塩酸イリノテカン         | 150mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 90分       | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 4 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖             | 250mL                 | 点滴  | 90分       | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 5 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム     | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 120分      | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 5 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖             | 250mL                 | 点滴  | 120分      | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 6 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル         | 400mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 15分以内     | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 6 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖             | 50mL                  | 点滴  | 15分以内     | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 7 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル         | 1200mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h       | ●   | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 7 | 大塚生食注                   | 生理食塩液            | 500mL                 | 点滴  | 23h       | ●   | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 8 | 大塚生食注                   | 生理食塩液            | 50mL                  | 点滴  | 全開(15分以内) | -   | - | ● | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |



# 大腸がん: (279)UFT／LV+ベバシズマブ療法

DAY

| 順 | 薬                        | 成分                 | 投与量     | ルート | 投与時間          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---------|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 大塚生食注                    | 生理食塩液              | 50mL1瓶  | 点滴  | プライミング        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 2 | アパスチン点滴静注用<br>400mg/16mL | ベバシズマブ<br>(遺伝子組換え) | 15mg/kg | 点滴  | 90~30分        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 2 | テルモ生食                    | 生理食塩液              | 100mL1袋 | 点滴  | 90~30分        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 3 | 大塚生食注                    | 生理食塩液              | 50mL1瓶  | 点滴  | 全開(15分以内)     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 4 | UFT                      | テガフル・ウラシル          |         | 経口  | 1日3回<br>8時間間隔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | ● |
| 5 | ユーゼル                     | ホリナートカルシウム         |         | 経口  | 1日3回<br>8時間間隔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | ● |

## 大腸がん: (280)S-1+ベバシズマブ療法(6週間)

DAY

| 順 | 薬                        | 成分                   | 投与量                       | ルート | 投与時間          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 大塚生食注                    | 生理食塩液                | 50mL1瓶                    | 点滴  | プライミング        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |
| 2 | アパステン点滴静注用<br>400mg/16mL | ベバシズマブ<br>(遺伝子組換え)   | 15mg/kg                   | 点滴  | 90~30分        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 2 | テルモ生食                    | 生理食塩液                | 100mL1袋                   | 点滴  | 90~30分        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | 大塚生食注                    | 生理食塩液                | 50mL1瓶                    | 点滴  | 全開(15分以内)     | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | S-1                      | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム | S-1ha.80<br>~120mg/day/分2 | 経口  | 1日3回<br>8時間間隔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | - |



## 大腸がん: (292) FOLFOXIRI+B-mab(入院)維持療法

DAY

| 順 | 薬                       | 成分           | 投与量                   | ルート | 投与時間                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
|---|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 50mL                  | 点滴  | プライミング              | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |   |
| 2 | アバステン                   | ベバシズマブ       | 5mg/kg                | 点滴  | 90分→<br>60分→<br>30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 2 | テルモ生食                   | 生理食塩液        | 100mL                 | 点滴  | 90分→<br>60分→<br>30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 3 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 120分                | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 3 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖         | 250mL                 | 点滴  | 120分                | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 4 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル     | 1600mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h                 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 4 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 500mL                 | 点滴  | 23h                 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 5 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル     | 1600mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h                 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 5 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 500mL                 | 点滴  | 23h                 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 6 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 50mL                  | 点滴  | 全開(15分以内)           | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - |



## 大腸がん: (294) FOLFOXIRI+B-mab(外来)維持療法

DAY

| 順 | 薬                       | 成分           | 投与量                   | ルート | 投与時間                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|---|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 50mL                  | 点滴  | プライミング<br>30分         | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |
| 2 | アバステン注                  | ペバシズマブ       | 5mg/kg                | 点滴  | 忍容性<br>があれば60分<br>30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 2 | テルモ生食                   | 生理食塩液        | 100mL                 | 点滴  | 忍容性<br>があれば60分<br>30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 120分                  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 3 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖         | 250mL                 | 点滴  | 120分                  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル     | 3200mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 46h                   | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |
| 4 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 100mL                 | 点滴  | 46h                   | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |

## 大腸がん: (295)m-FOLFOXIRI+B-mab(入院)導入療法

DAY

| 順  | 薬                        | 成分           | 投与量                   | ルート | 投与時間        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
|----|--------------------------|--------------|-----------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1  | イメンドカブセル120mg            | アプレピタント      | 120mg                 | 経口  | アロキシ開始45分前  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 2  | 大塚生食注                    | 生理食塩液        | 50mL                  | 点滴  | ブライミング      | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 3  | アバスチン                    | ベバシズマブ       | 5mg/kg                | 点滴  | 90分→60分→30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 3  | テルモ生食                    | 生理食塩液        | 100mL                 | 点滴  | 90分→60分→30分 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 4  | デキサート注                   | デキサメタゾン      | 3.3mg3管               | 点滴  | 全開(15分以内)   | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 4  | パロノセロン点滴静注               | パロノセロン       | 50mL                  | 点滴  | 全開(15分以内)   | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 5  | トポテシン注                   | 塩酸イリノテカン     | 150mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 90分         | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 5  | 大塚糖液5%                   | ブドウ糖         | 250mL                 | 点滴  | 90分         | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 6  | オキサリプラチン点滴               | オキサリプラチン     | 85mg/m <sup>2</sup>   | 点滴  | 120分        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 6  | 大塚糖液5% 250mL             | 糖液           | 250mL                 | 点滴  | 120分        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 7  | レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 120分        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 7  | 大塚糖液5%                   | ブドウ糖         | 250mL                 | 点滴  | 120分        | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 8  | 5-FU注250 協和              | フルオロウラシル     | 1200mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h         | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 8  | 大塚生食注                    | 生理食塩液        | 500mL                 | 点滴  | 23h         | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 9  | 5-FU注250 協和              | フルオロウラシル     | 1200mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h         | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | ● |
| 9  | 大塚生食注                    | 生理食塩液        | 500mL                 | 点滴  | 23h         | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | ● |
| 10 | 大塚生食注                    | 生理食塩液        | 50mL                  | 点滴  | 全開(15分以内)   | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - |
| 11 | イメンドカブセル80mg             | アプレピタント      | 80mg                  | 経口  | 午前中         | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |









# 大腸がん: (300) FOLFOXIRI(入院)維持療法

DAY

| 順 | 薬                               | 成分               | 投与量                       | ルート | 投与時間      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
|---|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 大塚生食注                           | 生理食塩液            | 50mL                      | 点滴  | プライミング    | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 2 | レボホリナー<br>ト点滴静注用<br>100mg「ヤクルト」 | レボホリナー<br>トカルシウム | 200mg/m <sup>2</sup>      | 点滴  | 120分      | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 2 | 大塚糖液5%                          | ブドウ糖             | 250mL                     | 点滴  | 120分      | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 3 | 5-FU注250<br>協和                  | フルオロウラ<br>シル     | 1600mg/<br>m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 3 | 大塚生食注                           | 生理食塩液            | 500mL                     | 点滴  | 23h       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 4 | 5-FU注250<br>協和                  | フルオロウラ<br>シル     | 1600mg/<br>m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h       | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | ● |
| 4 | 大塚生食注                           | 生理食塩液            | 500mL                     | 点滴  | 23h       | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | ● |
| 5 | 大塚生食注                           | 生理食塩液            | 50mL                      | 点滴  | 全開(15分以内) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - |







# 大腸がん: (304)m-FOLFOXIRI(入院)維持療法

DAY

| 順 | 薬                       | 成分           | 投与量                   | ルート | 投与時間      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
|---|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 50mL                  | 点滴  | プライミング    | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |   |   |
| 2 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴  | 120分      | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 2 | 大塚糖液5%                  | ブドウ糖         | 250mL                 | 点滴  | 120分      | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 3 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル     | 1200mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 3 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 500mL                 | 点滴  | 23h       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | - |   |
| 4 | 5-FU注250協和              | フルオロウラシル     | 1200mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 23h       | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 4 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 500mL                 | 点滴  | 23h       | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ● | - |
| 5 | 大塚生食注                   | 生理食塩液        | 50mL                  | 点滴  | 全開(15分以内) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - |





## 大腸がん: (310)エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ併用療法

DAY

| 順 | 薬             | 成分              | 投与量                      | ルート | 投与時間      | DAY |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---------------|-----------------|--------------------------|-----|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |               |                 |                          |     |           | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL                     | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 1 | ポララミン注5mg     | マレイン酸クロルフェニラミン  | 0.5%1mL1管                | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 1 | デキサート注射液      | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 3.3mg1管                  | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 2 | アービタックス注100mg | セツキシマブ          | (初回)400mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | (初回)120分  | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 2 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL                    | 点滴  | (初回)120分  | ●   | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    |
| 3 | アービタックス注100mg | セツキシマブ          | (以後)250mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 120分→60分  | -   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 3 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL                    | 点滴  | 120分→60分  | -   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 4 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL                     | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 5 | ピラフトピカプセル     | エンコラフェニブ        | 300mg                    | 経口  |           | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |
| 6 | メクトビ錠         | ビニメチニブ          | 1回45mg1日2回               | 経口  |           | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |

## 大腸がん: (310)エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ併用療法

DAY

| 順 | 薬                 | 成分                      | 投与量                          | ルート | 投与時間         | DAY |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----|--------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |                   |                         |                              |     |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 大塚生食注             | 生理食塩液                   | 50mL                         | 点滴  | 全開(15分以内)    | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 1 | ポララミン注<br>5mg     | マレイン酸ク<br>ロルフェニラミ<br>ン  | 0.5%1mL1<br>管                | 点滴  | 全開(15分以内)    | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 1 | デキサート注<br>注射液     | リン酸デキサ<br>メタゾンナトリ<br>ウム | 3.3mg1管                      | 点滴  | 全開(15分以内)    | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 2 | アービタック<br>ス注100mg | セツキシマブ                  | (以後)<br>250mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 120分→<br>60分 | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 2 | 大塚生食注             | 生理食塩液                   | 250mL                        | 点滴  | 120分→<br>60分 | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 3 | 大塚生食注             | 生理食塩液                   | 50mL                         | 点滴  | 全開(15分以内)    | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 4 | ピラフトピカ<br>プセル     | エンコラフェ<br>ニブ            | 300mg                        | 経口  |              | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |
| 5 | メクトビ錠             | ビニメチニブ                  | 1回45mg1<br>日2回               | 経口  |              | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |



# 大腸がん:(311)エンコラフェニブ+セツキシマブ併用療法

DAY

| 順 | 薬             | 成分              | 投与量                      | ルート | 投与時間      | DAY |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---------------|-----------------|--------------------------|-----|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |               |                 |                          |     |           | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL                     | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 1 | ポララミン注5mg     | マレイン酸クロルフェニラミン  | 0.5%1mL1管                | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 1 | デキサート注射液      | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 3.3mg1管                  | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 3 | アービタックス注100mg | セツキシマブ          | (以後)250mg/m <sup>2</sup> | 点滴  | 120分→60分  | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 3 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL                    | 点滴  | 120分→60分  | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 4 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL                     | 点滴  | 全開(15分以内) | ●   | - | - | - | - | - | - | ● | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  |    |
| 5 | ビラフトビカプセル     | エンコラフェニブ        | 300mg                    | 経口  |           | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |

# 大腸がん: (357)HER+PER(初回)療法

DAY

| 順 | 薬             | 成分              | 投与量            | ルート | 投与時間      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---------------|-----------------|----------------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL1瓶         | 点滴  | プライミング    | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2 | パージェタ         | ペルツズマブ          | 840mg          | 点滴  | 60分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL1袋        | 点滴  | 60分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2 | パージェタ         | ペルツズマブ          | 420mg          | 点滴  | 30分       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL1袋        | 点滴  | 30分       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL1袋         | 点滴  | 全開(15分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4 | トラスツズマブ注射用150 | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 8mg/kg<br>⇒6mg | 点滴  | 90分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL1袋        | 点滴  | 90分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4 | トラスツズマブ注射用150 | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 6mg/kg         | 点滴  | 60~30分    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL1袋        | 点滴  | 60~30分    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL1瓶         | 点滴  | 全開(15分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

# 大腸がん: (358)HER+PER(2回目以降)療法

DAY

| 順 | 薬             | 成分              | 投与量     | ルート | 投与時間      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---------------|-----------------|---------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL1袋  | 点滴  | プライミング    | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2 | パージェタ         | ペルツズマブ          | 420mg   | 点滴  | 30分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL1袋 | 点滴  | 30分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL1袋  | 点滴  | 15分       | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4 | トラスツズマブ注射用150 | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 6mg/kg  | 点滴  | 60~30分    | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 4 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 250mL1袋 | 点滴  | 60~30分    | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5 | 大塚生食注         | 生理食塩液           | 50mL1瓶  | 点滴  | 全開(15分以内) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |