

レジメン名称

子宮体:(123)CAP療法

子宮体:(172)TC療法

子宮体:(217)AP療法

子宮体:(239)ドセタキセル + CBDCA療法

子宮体がん:(123)CAP療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	500mL 2瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	500mL 2瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	パロノセトロン静注バッグ50mL	パロノセトロン塩酸塩	50mL	側注1	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg 3管	側注1	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ピラルピシン	ピラルピシン	30mg/m ²	側注1	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	側注1	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	500mL 2瓶	点滴	6時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	300mL 1/2瓶	側注2	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ランダ注	シスプラチン	50mg/m ²	側注1	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	大塚生食注	生理食塩液	500mL	側注1	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	500mg/m ²	側注2	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	大塚生食注	生理食塩液	500mL	側注2	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	300mL 1/2瓶	側注2	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	500mL 2瓶	点滴	6時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	イメンドカプセル(125mg)	アプレピタント	125mg	経口	午前中	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	イメンドカプセル(80mg)	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-

子宮体がん:(172)TC療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ファモチジン注「サワイ」	ファモチジン	1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	5錠	経口	タキソール30分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	イメンドカプセル	アプレピタント	125mg	経口	パラプラチン1時間前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
8	イメンドカプセル	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	

子宮体がん:(217)AP療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	アクチット注	酢酸リンゲル	500mL1袋	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	イメンドカプセル125mg	アブレピタント	125mg	経口	プリプラチン1時間前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	イメンド80mg	アブレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	
5	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	パロノセトロン点滴静注075mg	パロノセトロン	50ml	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	テラルピシン注射液10mg	塩酸ピラルピシン	60mg/m ²	点滴	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	点滴	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	プリプラチン注	シスプラチン	50mg/m ²	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	150ml	点滴	20分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	24時まで	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	0から6時間	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
12	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	6時間	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
12	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	6時間	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
12	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	6時間かけて24時まで	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-

子宮体がん：(239)DJ療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ワンタキソテール注	ドセタキセル水和物	75mg/m ²	点滴	1h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	1h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5	点滴	1h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5%大塚糖液	糖液	250mL	点滴	1h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5%大塚糖液	糖液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-