

レジメン名称

[食道:\(1\)ドセタキセル療法](#)
[食道:\(84\)放射線併用FP療法](#)
[食道:\(146\)FP療法](#)
[食道:\(152\)weekly-パクリタキセル療法](#)
[食道:\(189\)術前FP療法](#)
[食道:\(317\)m-FOLFOX6\(入院\)療法](#)
[食道:\(318\)m-FOLFOX6\(外来\)療法](#)
[食道:\(333\)DCF療法](#)
[食道:\(342\)ニボルマブ単剤療法](#)

食道がん:(1)ドセタキセル療法

@PATIENTNAME

			DAY																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセトロン	50ml	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	70mg/m ²	点滴	60分以上かけ	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL	点滴	60分以上かけ	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50ml	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

食道がん:(84)放射線併用FP療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ソリューゲンf注	酢酸リンゲル液	500ml	点滴	8h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	ソリューゲンf注	酢酸リンゲル液	500ml	点滴	8h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	ソリューゲンf注	酢酸リンゲル液	500ml	点滴	8h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	プリンペラン注10mg	メクロプラミド	2mL1管	点滴	8h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	5-FU注250協和	フルオロウラシル	350mg/m ²	側注	12h	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4	大塚生食注	生理食塩液	500mL	側注	12h	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
5	5-FU注250協和	フルオロウラシル	350mg/m ²	側注	12h	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
5	大塚生食注	生理食塩液	500mL	側注	12h	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
6	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2A	側注	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	パロノセトロン静注用パッケジ	パロノセトロン	50mL	側注	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	ランダ注	シスプラチン	70mg/m ²	側注	2h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	500mL	側注	2h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	ソリューゲンf注	酢酸リンゲル液	500ml	側注	2h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	ラシックス注20mg	フロセミド	20mg1/1管	側注	2h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
9	大塚生食注	生理食塩液	50mL	側注	全開(15分以内)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
10	放射線治療		平日5回/週			●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	

食道がん:(146)FP療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル	500mL1瓶	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	パロノセトロン点滴用	パロノセトロン	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	1ml3A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル	500mL1瓶	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	5-FU注250協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	12H	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	点滴	12H	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
5	プリプラチン注	シスプラチン	80mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	ラシックス注20mg	フロセミド	20mg1管	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	500mL1袋	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	500mL1袋	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	プリンペラン注	メトクロプラミド	2mL1A	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	5-FU注250協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	12H	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
8	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	12H	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
9	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	イメドカプセル	アプレピタント	120mg	経口	プリプラチン60~90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
11	イメドカプセル	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

食道がん:(152)Weekly-パクリタキセル(B法)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg*5錠	経口	タキソール30分前	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ファモチジン注射用	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	グラニセトン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセトン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	100mg/m ²	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	生食	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

食道がん:(189)術前FP療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル	500mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	パロノセトンバッグ	パロノセトン	50ml	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル	500mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5-FU注250協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	12時間	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	12時間	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
5	プリブラチン注	シスプラチン	80mg/m ²	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ランックス注20mg	フロセミド	20mg1管	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル	500mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5-FU注250協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	12時間	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
7	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	12時間	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
8	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル	500mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	プリンペラン注	メクロプラミド	2mL1A	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
10	イメンドカプセル	アプレピタント	125mg	経口	プリブラチン1時間前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
11	イメンドカプセル	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-

食道がん:(317)m-FOLFOX6(入院)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	パロノセトロン注射用0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	オキサリプラチン注射用100mg	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	レボホリナー ト点滴静注用100mg ¹	レボホリナー トカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	5-FU注250協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	50mL	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	5-FU注250協和	フルオロウラシル	1200mg/m ²	点滴	23h	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
5	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	23h	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

食道がん:(318)m-FOLFOX6(外来)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
1	パロノセロン注射液 0.75mg	パロノセロン塩酸塩	0.75mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
2	オキサリプラチン注射液 100mg	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
3	レボホリナート点滴静注用 100mg ¹	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
4	5-FU注250 協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
5	5-FU注250 協和	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		

食道がん: (333)DCF療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	フソ-生理食塩液	生理食塩液	1000mL1袋	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
1	アスパラカリウム	アスパラギン酸カリウム	1A 10mL	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	硫酸マグネシウム補正液	マグネシウム硫酸塩	1A 20mL	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	フソ-生理食塩液	生理食塩液	1000mL1袋	点滴	24時間	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
2	5FU注	フルオロウラシル	750mg/m ²	点滴	24時間	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
3	グラニセトロン注	グラニセトロン	3mg/50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg×3	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	ドセタキセル注	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	5%大塚糖液注	ブドウ糖	250mL1瓶	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	ラシックス注	フロセミド	20mg/A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	ランダ注	シスプラチン	70mg/m ²	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
8	ジーラスタ注	ベグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
10	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
10	プリンペラン	メクロプラミド	2A	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
10	デキサート注	デキサメタゾン	2A	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
11	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	プリンペラン	メクロプラミド	2A	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	YDソリタT3輸液	維持輸液	500mL1袋	点滴	2時間	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
13	YDソリタT3輸液	維持輸液	500mL1袋	点滴	2時間	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
14	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	点滴	2時間	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
15	イメドカプセル	アプレピタント	125mg	経口	シスプラチン投与1時間前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
16	イメドカプセル	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

食道がん:(342)ニボルマブ療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-