

レジメン名称

[非小細胞肺:\(23\)ビノレルビン療法](#)
[非小細胞肺:\(24\)ドセタキセル療法](#)
[非小細胞肺:\(36\)ゲムシタピン療法](#)
[非小細胞肺:\(51\)CPT-11単独療法A法\(3投2休\)](#)
[非小細胞肺:\(51\)CPT-11単独療法A法\(4投2休\)](#)
[非小細胞肺:\(259\)ペムブロリズマブ単独療法](#)
[非小細胞肺:\(260\)nab-パクリタキセル単独療法](#)
[非小細胞肺:\(261\)ペトレキセドナトリウム単独療法](#)
[非小細胞肺:\(262\)ドセタキセル療法](#)
[非小細胞肺:\(263\)ペムブロリズマブ + PEM療法](#)
[非小細胞肺:\(264\)ペムブロリズマ + PEM + CBDCA療法](#)
[非小細胞肺:\(265\)ペムブロリズマブ + PEM + CDDP療法](#)
[非小細胞肺:\(266\)PEM + CBDCA療法](#)
[非小細胞肺:\(267\)PEM + CBDCA + BEV療法](#)
[非小細胞肺:\(268\)nab-パクリタキセル + CBDCA療法](#)
[非小細胞肺:\(276\)CDDP + VNR療法](#)
[非小細胞肺:\(277\)nab-パクリタキセル + ペムブロリズマブ療法](#)
[非小細胞肺:\(278\)アテゾリズマブ療法](#)
[非小細胞肺:\(282\)ベバシズマブ\(+EGFR TKI\)療法](#)
[非小細胞肺:\(316\)CBDCA+PTX+BEV+アテゾリズマブ療法](#)
[非小細胞肺:\(319\)ラムシルマブ+EGFR-TKI療法](#)
[非小細胞肺:\(320\)ペムブロリズマブ単独\(6週間間隔\)療法](#)
[非小細胞肺:\(324\)BEV+アテゾリズマブ療法](#)
[非小細胞肺:\(329\)PTX+CBDCA+Pembrolizumab療法](#)
[非小細胞肺:\(330\)ニボルマブ+イピリムマブ療法](#)
[非小細胞肺:\(340\)ニボルマブ+イピリムマブ+PEM+CBDCA療法](#)
[非小細胞肺:\(340\)ニボルマブ+イピリムマブ+PEM+CBDCA療法後の維持療法](#)
[非小細胞肺:\(341\)ニボルマブ+イピリムマブ+PTX+CBDCA療法](#)
[非小細胞肺:\(341\)ニボルマブ+イピリムマブ+PTX+CBDCA療法後の維持療法](#)
[非小細胞肺:\(350\)デュルバルマブ療法](#)

非小細胞肺がん：(23)VNB療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ナベルピン注10	酒石酸ビノルビン	25mg/m ²	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-

非小細胞肺がん：(24)ドセタキセル療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ワンタキソテール注	ドセタキセル水和物	75mg/m ²	点滴	60分以上かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL	点滴	60分以上かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞肺:CPT-11単独療法A法(3投2休)

薬品名	投与量	day1	day8	day15	Day
トポテシン点滴静注	100mg/m ²	○	○	○	
休薬完了					休

非小細胞肺:CPT-11単独療法A法(4投2休)

薬品名	投与量	day1	day8	day15	Day	day42
トポテシン点滴静注	100mg/m ²	○	○	○	○	
休薬完了						休

非小細胞肺癌：(259)ペムブロリズマブ単独療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞肺癌：(260)nab-パクリタキセル単独療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾン	3.3mg*2A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	アブラキサン点滴用100mg	パクリタキセル100mg	100mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

非小細胞肺癌：(261)ペムトレキセドナトリウム療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	デキサメタゾン	3.3mg*1A	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	5分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	アリムタ注射用	ペムトレキセドNa	500mg/m ²	点滴	10分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	10分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞肺癌：(262)ドセタキセル療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセトロン	グラニセトロン3mg	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	70mg/m ²	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	

非小細胞肺癌：(263)ペムブロリズマブ+ペトレキセド療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg1管	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	アリムタ注	ペトレキセド	500mg/m ²	点滴	12分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	12分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞肺がん：(265)ペムブロリズマブ+PEM+CDDP療法

		Day																																			
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	硫酸Mg補正液	硫酸Mg	20mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	補正用1モルKCLテルモ	KCL	20mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	YDソリタT1号輸液	開始液	50mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg 1カプセル	内服		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg 1カプセル	内服		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
4	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)																																
6	デキササート注	デキサメタゾン	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	アリムタ注射用	ペトレキセド	500mg/m ²	点滴	12分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	12分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	マンニトールS 20%	マンニトール	300mL1便	点滴	45分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ランダ注	シスプラチン注	75mg/m ²	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	大塚生食注250mL	生理食塩液	250mL 1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ソリタT1	開始液	500mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	補正用1モルKCLテルモ	KCL	20mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

非小細胞肺癌：(266)PEM+CBDCA療法

				Day																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg 1カプセル	内服	カルボプラチン開始60分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg 1カプセル	内服	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
2	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	アリムタ注射用	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴	10分かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	10分かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	パラプラチン注	カルボプラチン注	AUC4~6	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注250mL	生理食塩液	250mL 1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	生理食塩液50mL	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞肺がん：(267)PEM+CBDCA+BEV療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg 1カプセル	内服	カルボプラチン開始60分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg 1カプセル	内服	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
2	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	アリムタ注射用	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴	10分かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	10分かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	パラプラチン注	カルボプラチン注	AUC4~6	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食250mL	生理食塩液	250mL 1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90分→60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	90分→60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞肺がん：(268)nab-パクリタキセル+CBDCA療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	イメンド	アプレピタント	125mg	経口	パラプラチン開始60分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾン	3.3mg*2A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	パロノセトロン点滴静注	パロノセトロン	0.75mg 50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾン	3.3mg*2A	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	大塚生食液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	パクリタキセル点滴用100mg	パクリタキセル100mg	100mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	パラプラチン注	カルボプラチン注	AUC4~6	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚生食注250mL	生理食塩液	250mL 1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	イメンド	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

非小細胞肺がん：(276)CDDP+VNR療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	YDソリタT1号輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	プライミング	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	ナベルピン注	ビノレルピン	25mg/m ²	点滴	5分以上かけて	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	5分以上かけて	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	硫酸Mg補正液	硫酸Mg	8mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	アスパラK	アスパラギン酸カリウム	10mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	YDソリタT1号輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ソリタT1	開始液	500mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	パロノセトロン点滴静注バッグ75mg	パロノセトロン塩酸塩	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg 1カプセル	内服	経口	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg 1カプセル	内服	経口	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
9	ランダ注	シスプラチン注	80mg/m ²	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	大塚生食注500mL	生理食塩液	500mL 1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	マンニトールS 20%	マンニトール	300mL1便	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	アスパラK	アスパラギン酸カリウム	10mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ソリタT1	開始液	500mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ソリタT1	開始液	500mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	

非小細胞肺癌：(277)nab-パクリタキセル+CBDCA+Pembrolizumab療法

					Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60mL/h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	キイトルーダ点滴静注	ペンブロリズマブ	200mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	イメンド	アブレピタント	125mg	経口	パラプラチン開始60分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾン	3.3mg*2A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	パロノセトロン点滴静注	パロノセトロン	0.75mg 50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾン	3.3mg*2A	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	アブラキサン点滴用100mg	パクリタキセル100mg	100mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
8	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
9	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	パラプラチン注	カルボプラチン注	AUC4~6	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	大塚生食注250mL	生理食塩液	250mL 1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
11	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-

非小細胞肺癌：(278)アテゾリズマブ単独療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200mg	点滴	初回60分→2回目以降30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	初回60分→2回目以降30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞肺癌：(282)ベバシズマブ(+EGFR TKI)併用療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	アバステン点滴静注用 400mg/16mL	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	15mg/kg	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞肺癌：(316) CBDCA+PTX+BEV+アテゾリズマブ療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴	60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL 1袋	内服	60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	アバステン点滴静注	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90分→60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	90分→60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	デキサート注	デキサメタゾン	100mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ポララミン注	クロルフェニラミンマレイン酸塩	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ファモチジン注	ファモチジン注	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	パロノセトロン点滴静注	パロノセトロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	タキソール注	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴	180分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	180分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	イメンドカプセル125mg	アブレピタント	125mg 1カプセル	内服	パラプラチン投与開始60分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	パラプラチン	カルボプラチン	AUC=6	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5%大塚糖液注	ブドウ糖	250mL 1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5%大塚糖液注	ブドウ糖	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	イメンドカプセル80mg	アブレピタント	80mg 1カプセル	内服	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	8mg	内服	朝昼食後	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞がん:(319)ラムシルマブ+EGFR-TKI併用療法

						Day																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	ボララミン注5mgJ	マレイン酸クロルフェニラミン	1mL1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	サイラムザ	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

※28日間

*:医師の判断で、サイラムザ投与3回目以降の観察時間を削除する場合は、生理食塩液の投与時間を短縮する

非小細胞肺癌：(320)ペムブロリズマブ単独(6週間間隔)療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	400mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

非小細胞肺癌：(324)BEV+アテゾリズマブ療法【(316)の維持療法】

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴	60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL 1袋	内服	60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	アバステン点滴静注	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	90分→60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	90分→60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

非小細胞肺がん：(329)パクリタキセル+CBDCA+Pembrolizumab療法

						Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60mL/h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	イメンド	アプレピタント	125mg	経口	パラプラチン開始60分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	イメンド	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾン	3.3mg*2A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	パロノセトロン点滴静注	パロノセトロン	0.75mg 50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾン	3.3mg*2A	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	パクリタキセル点滴用100mg	パクリタキセル100mg	200mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
9	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
10	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	パラプラチン注	カルボプラチン注	AUC4~6	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	大塚生食注250mL	生理食塩液	250mL 1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	大塚生食注50mL	生理食塩液	50mL 1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

非小細胞肺がん：(330)ニボルマブ+イピリムマブ併用療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ポララミン注	クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	360mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ヤーボイ点滴静注液	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ニボルマブは3週間隔、イピリムマブは6週間隔

非小細胞肺癌：(332)ラムシルマブ+ドセタキセル療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ポララミン注	クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	サイラムザ	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ドセタキセル注	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

※28日間

非小細胞肺癌：(340)ニボルマブ+イピリムマブ+PEM+CBDCA併用療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ボラミン注	クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	360mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ヤーボイ点滴静注液	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	イメンドカプセル	アプレピタン	125mg	経口	アリムタ開始60分~90分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	イメンドカプセル	アプレピタン	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	グラニセトロン点滴静注	グラニセトロン	3mg/50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	デキサート注射液	デキサメタゾン	3.3mg*3A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9	アリムタ注射用	ペトレキセド	500mg/m ²	点滴	10分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	10分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	パラブラチン注射液	カルボプラチン	AUC=6	点滴	60分間かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分間かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
11	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

※ニボルマブは3週間隔、イピリムマブは6週間隔

非小細胞肺がん：(340)ニボルマブ+イピリムマブ併用療法の維持療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ポララミン注	クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	360mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ヤーボイ点滴静注液	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ニボルマブは3週間隔、イピリムマブは6週間隔

非小細胞肺癌：(341)ニボルマブ+イピリムマブ+PTX+CBDCA併用療法

					Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ボララミン注	クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	360mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ヤーボイ点滴静注液	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	イメンドカプセル	アブレピタン	125mg	経口	アリムタ開始60分~90分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	イメンドカプセル	アブレピタン	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
8	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	グラニセロン点滴静注	グラニセロン	3mg/50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	デキサート注射液	デキサメタゾン	3.3mg*3A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ファモチジン注	ファモチジン	20mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	タキソール注	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	パラプラチン注射液	カルボプラチン	AUC=6	点滴	60分間かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分間かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	2錠 分1	経口	朝夕食後	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-

※ニボルマブは3週間隔、イピリムマブは6週間隔

非小細胞肺がん：(341)ニボルマブ+イピリムマブ併用療法の維持療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ポララミン注	クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	360mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ヤーボイ点滴静注液	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ニボルマブは3週間隔、イピリムマブは6週間隔

非小細胞肺癌：(350)デュルバルマブ療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚食塩液	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	イミフィンジ注	デュルバルマブ	10mg/kg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-