

## レジメン名称

[卵巣:\(25\)dose-dense TC療法](#)  
[卵巣:\(72\)ドセタキセル + CBDCA療法](#)  
[卵巣:\(73\)ドキソルビシン\(アドリアマイシン\)単独療法](#)  
[卵巣:\(95\)CPT-11 + CBDCA療法](#)  
[卵巣:\(100\)ゲムシタビン療法](#)  
[卵巣:\(111\)ノギテカン療法](#)  
[卵巣:\(115\)CPT-11単独\(A法3投\)療法](#)  
[卵巣:\(115\)CPT-11単独\(A法4投\)療法](#)  
[卵巣:\(149\)CPT-11単独\(3投2休\)療法](#)  
[卵巣:\(149\)CPT-11単独\(4投2休\)療法](#)  
[卵巣:\(164\)ゲムシタビン + CBDCA\(GC\)療法](#)  
[卵巣:\(166\)CPT-P療法](#)  
[卵巣:\(176\)monthly-TC療法](#)  
[卵巣:\(191\)TC + ベバシズマブ療法](#)  
[卵巣:\(194\)weekly-TC + ベバシズマブ\(4週間\)療法](#)  
[卵巣:\(195\)wTC減感作療法](#)  
[卵巣:\(202\)TC + ベバシズマブ\(3週間\)療法](#)  
[卵巣:\(203\)ベバシズマブ単独療法](#)  
[卵巣:\(208\)パクリタキセル療法](#)  
[卵巣:\(214\)Tri weekly-TC療法](#)  
[卵巣:\(236\)CPT-11 + ベバシズマブ療法](#)  
[卵巣:\(269\)CBDCA単独療法](#)  
[卵巣:\(272\)ノギテカン + ベバシズマブ療法](#)  
[卵巣:\(275\)TN\(PTX + NDP\)療法](#)  
[卵巣:\(283\)ドキソルビシン + CBDCA療法](#)  
[卵巣:\(290\)ドキソルビシン+ベバシズマブ療法](#)  
[卵巣:\(335\)ドキソルビシン+CBDCA+BEV療法](#)

# 卵巣がん:(25)TC療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ファモチジン注20mg	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
1	グラニセトロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg100mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg1錠	経口	3開始30分前	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	100mL1瓶	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5~6	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚糖液5%	ブドウ糖	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 卵巣がん:(72)DJ療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	75mg/m <sup>2</sup>	点滴	1h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	1h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5	点滴	1h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5%大塚糖液	糖液	250mL	点滴	1h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5%大塚糖液	糖液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

## 卵巣がん：(73)ドキシソルピシン単剤療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg2A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ポララミン注射液5mg	マレイン酸クロルフェニラミン	5mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	ドキシル注射液20mg	塩酸ドキシソルピシン	50mg/m <sup>2</sup>	点滴	1mg/分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL	点滴	1mg/分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL	点滴	②と同じ時間で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	ピドキサール錠10mg	リン酸ピリドキサル	10mg1錠	経口	10錠分2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
5	含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム	0.1%1g	外用	5包分5	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	ヒルドイド軟膏orローション	ヘパリン類似物質	1g	外用	1日数回塗布	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	

## 卵巣がん：(95)トポテシン＋CBDCA療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	トポテシン	イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	生理食塩液	生理食塩液	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=4	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

## 卵巣がん:(100)ゲムシタビン療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1000mg/ml	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

## 卵巣がん：(111)ノギテカン療法

						Day																													
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
2	ハイカムチン注射用1.1mg	塩酸ノギテカン	1.5mg/m <sup>2</sup> 1.1mg1瓶	点滴	30分	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-

## 卵巣がん：(115)CPT-11単独(A法3投)療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	トポテンシ注	塩酸イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚生食	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-



# 卵巣がん：(115)CPT-11単独(A法4投)療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	トポテンシ注	塩酸イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

※4投1休

## 卵巣がん：(149)CPT-11単独(3投2休)療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	トポテシン注	塩酸イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 卵巣がん：(149)CPT-11単独(4投2休)療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	トポテシン注	塩酸イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

※4投2休

# 卵巣がん:(164)ゲムシタビン+CBDCA(GC)療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
3	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=4	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-

## 卵巣がん：(176)monthlyTC療法

		Day																																			
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg1錠	経口	タキソール1H前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg5錠	経口	タキソール30分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ファモチジン注20mg	ファモチジン塩酸塩	1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg100mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg1錠	経口		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 卵巣がん:(191)TC+ベバシズマブ療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ファモチジン注20mg	ファモチジン	1管20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	170mg/m <sup>2</sup>	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1袋	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	15mg/kg	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	イメンドカプセル	アプレピタント	125mg	経口	タキソール前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
9	イメンドカプセル	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
10	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドรามミン	10mg 5錠	経口	タキソール前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

# 卵巣癌：(202)TC+ベバシズマブ療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ファモチジン注	ファモチジン 20mg	1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	170mg/m <sup>2</sup>	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=6	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1袋	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	15mg/kg	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	イメンドカプセル	アプレピタント	125mg	経口	タキ70分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9	イメンドカプセル	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
10	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg 5錠	経口	タキ30分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

# 卵巣がん：(208)パクリタキセル療法

		Day																																					
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	グラニセトロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg/100mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-				
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg/1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
1	ファモチジン	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
2	ベナ錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg/5錠	経口	タキソール開始前30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
3	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

※3投1休



# 卵巣がん: (214) Tri weekly-TC療法

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg	経口	パラプラチン1時間前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	5錠	経口	タキソール30分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ファモチジン注射液20mg	ファモチジン塩酸塩	1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	3時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
7	テルモ生食	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-

## 卵巣がん：(236)CPT-11+ベバシズマブ併用療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	トボテシン注	塩酸イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚生食	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	アパスチン	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	90分→60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	90分→60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

\* 必要によりイメンドを処方

# 卵巣がん：(269) CBDCA単独療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	イメドカプセル125mg	アプレピタント	125mg 1cap	経口	パラプラチン開始 60分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=4	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

# 卵巣がん：(272)ノギテカン+ベバシズマブ併用療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
1	グラニセロン塩酸塩点滴静注用3mgバッグ	グラニセロン塩酸塩	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
2	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	1.5mg/m <sup>2</sup> 1.1mg1瓶	点滴	30分	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
3	アバスチン点滴静注	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	90~30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-

## 卵巣がん：(275)TN(パクリタキセル+ネダプラチン)併用療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	アクチット注	酢酸リンゲル液	500mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ファモチジン注20mg	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	グラニセロン塩酸塩点滴静注用3mgバッグ	グラニセロン塩酸塩	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	レスタミンコーワ錠	ジフェンヒドラミン	5錠	経口		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	タキソール注	パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	点滴	180分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	5%糖液500mL	ブドウ糖液	500mL	点滴	180分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	アクプラ注	ネダプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	アクチット注	酢酸リンゲル液	500mL	点滴	180分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	アクチット注	酢酸リンゲル液	500mL	点滴	180分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

## 卵巣がん：(283)ドキシソルビシン+CBDCA療法

		Day																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセトロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ドキシル	ドキシソルビシン	30mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚糖液注	ブドウ糖液	250mL1瓶	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚糖液注	ブドウ糖液	250mL1瓶	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚糖液注	ブドウ糖液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

## 卵巣がん：(290)ドキシソルビシン+ベバスズマブ療法

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	Day																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	ドキシル	ドキシソルビシン	40mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚糖液注5%	ブドウ糖液	250mL1瓶	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	アバスチン点滴静注用	ベバスズマブ	~15mg/kg	点滴	初回90分→60分→30分(忍容性があれば)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	初回90分→60分→30分(忍容性があれば)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	

## 卵巣がん：(335)ドキシソルビシン+カルボプラチン+ベバシズマブ療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mgバッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ドキシル	ドキシソルビシン	30mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚糖液注	ブドウ糖液	250mL1瓶	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液注	ブドウ糖液	250mL1瓶	点滴	1時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	アバスチン注	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	初回90分→忍容性があれば60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	テルモ生食	生理食塩液	100mL1瓶	点滴	初回90分→忍容性があれば60分→30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-