

レジメン名称

[膀胱: \(21\) ゲムシタビン療法](#)
[膀胱: \(22\) S-1 + ゲムシタビン療法](#)
[膀胱: \(151\) S-1 + ゲムシタビン療法](#)
[膀胱: \(201\) nab-パクリタキセル + ゲムシタビン療法](#)
[膀胱: \(254\) m-FOLFIRINOX\(入院\)療法](#)
[膀胱: \(255\) m-FOLFIRINOX\(外来\)療法](#)
[膀胱: \(285\) FOLFIRINOX\(入院\)療法](#)
[膀胱: \(286\) FOLFIRINOX\(外来\)療法](#)
[膀胱: \(308\) nal-IRI + 5-FU + I-LV\(入院\)療法](#)
[膀胱: \(309\) nal-IRI + 5-FU + I-LV\(外来\)療法](#)

膵臓がん:(21)ゲムシタビン療法

						Day																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	グラニセトリンバッグ 3mg/50mL	塩酸グラニセトリン	3mg/50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

膵臓がん：(22)S-1+ゲムシタビン療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	グラニセトロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	デキササート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	S-1	アガチール ギメラシル・オ テラシル配合 剤	標準投与量	経口	分2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※GEST試験

膵臓がん:(151)TS-1+ジェムザール併用療法(GEMSAP)

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

※TS-1は2投2休

膵臓がん：(201)nab-パクリタキセル+ゲムシタビン療法

		Day																																		
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	パロノセトロンバッグ 0.75mg	パロノセトロン塩酸塩 0.75mg	0.75mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル注射用(アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

膵臓がん：(254)m-FOLFIRINOX(入院)療法

※入院用

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	イメンドカブセル120mg	アプレピタント	120mg	経口	アロキシ開始30分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
2	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	パロノセロン点滴静注	パロノセロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	オキサリプラチン点滴	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚糖液5% 250mL	糖液	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	トボテシン注	塩酸イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	レボホリナー ト点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナー トカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	5-FU注250協和	フルオロウラシル	1200mg/m ²	点滴	23h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	23h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	5-FU注250協和	フルオロウラシル	1200mg/m ²	点滴	23h	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	23h	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	イメンドカブセル80mg	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	

膵臓がん：(255)m-FOLFIRINOX(外来)療法

※外来用

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	イメンドカブセル125mg	アプレピタント	125mg	経口		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
2	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	パロノセトロン点滴静注	パロノセトロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	オキサリプラチン点滴	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液5% 250mL	糖液	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	トポテシン注	塩酸イリノテカン	180mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	5-FU注250協和	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	イメンドカブセル80mg	アプレピタント	80mg	経口		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

膵臓がん：(285)FOLFIRINOX(入院)療法

※入院用

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	イメンドカプセル120mg	アプレピタント	120mg	経口	パロノセトロン開始30分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
2	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	パロノセトロン点滴静注	パロノセトロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	オキサリプラチン点滴	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚糖液5%250mL	糖液	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	トポテン注	塩酸イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	5-FU注250協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	5-FU注250協和	フルオロウラシル	1200mg/m ²	点滴	23h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	23h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
8	5-FU注250協和	フルオロウラシル	1200mg/m ²	点滴	23h	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	23h	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
9	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	

膵臓がん：(286)FOLFIRINOX(外来)療法

※外来用

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg	経口	パロノセトロン開始60分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	パロノセトロン点滴静注	パロノセトロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	オキサリプラチン点滴	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液5% 250mL	糖液	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	トボテシン注	塩酸イリノテカン	180mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	5-FU注250協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	5-FU注250協和	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg	経口		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

膵臓がん: (308)nal-IRI+5-FU+I-LV療法(入院)

※入院用

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	パロノセトロン点滴静注	パロノセトロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	オニバイド点滴静注	イリノテカン塩酸塩水和物リゾゾーム製剤	70mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚糖液5% 250mL	糖液	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	5-FU注250協和	フルオロウラシル	1200mg/m ²	点滴	23h	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	23h	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

膵臓がん: (309)nal-IRI+5-FU+I-LV療法(外来)療法

※外来用

Day

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	デキサート注	デキサメタゾン	3.3mg3管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	パロノセトロン点滴静注	パロノセトロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	オニバイド点滴静注	イリノテカン塩酸塩水和物 リゾーム製剤	70mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚糖液5% 250mL	糖液	250mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	5-FU注250協和	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	100mL	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-