

レジメン名称

尿路上皮：(48)ゲムシタビン + CBDCA(GC)(AUC3)療法

尿路上皮：(48)ゲムシタビン + CBDCA(GC)(AUC4)療法

尿路上皮：(140)ゲムシタビン + CDDP(GC)療法

尿路上皮：(154)ゲムシタビン療法(デキサメタゾン)

尿路上皮：(154)ゲムシタビン療法(グラニセトロン)

尿路上皮：(258)ペムブロリズマブ単独療法

尿路上皮：(334)アベルマブ単独療法

尿路上皮：(335)エンホルツマブ ベドチン単独療法

尿路上皮がん:(140)ゲムシタビン+CDDP(GC)療法

						Day																																
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	ポタコールR	乳酸リンゲル	500mL	点滴	24時まで	●																																
2	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	ジェムザール注射用1g	塩酸ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	ポタコールR	乳酸リンゲル	500mL	点滴	0時から6時	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
6	アクチット	酢酸リンゲル	500mL	点滴	6時から12時	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
6	プリンペラン	メクロプラミド	2mL	点滴	6時から12時	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
7	パロノセトロン点滴用	パロノセトロン	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
7	デキサート注射液	デキサメタゾン	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
8	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	2時間かけて	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
8	プリブラチン	シスプラチン	70mg/m ²	点滴	2時間かけて	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
9	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	300ml	点滴	30分	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
10	ポタコールR	乳酸リンゲル	500mL	点滴	12時から18時	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
10	ファモチジン注射用20mg「サワイ」	ファモチジン	20mL1管	点滴	12時から18時	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
11	アクチット	酢酸リンゲル	500mL	点滴	18時から24時	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	

尿路上皮がん：(258)ペムブロリズマブ単独療法

						Day																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	240mg	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

尿路上皮がん：(334)アベルマブ単独療法

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	アセリオ点滴静注	アセトアミノフェン	1000mg	点滴	15分かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ポララミン注	クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ	10mg/kg	点滴	1時間かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	1時間かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

*アセトアミノフェンは、体重により用量調節することがあります。