

レジメン名称

[子宮:\(26\)TC療法](#)

子宮:(135)CPT-11 + CDDP療法

[子宮:\(174\)AP療法](#)

[子宮:\(248\)CPT-11単独療法\(3投2休\)](#)

子宮がん:(26)TC療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ファモチジン注	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg5錠	経口	タキソール30分前	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	80mg/m ² /day	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン	AUC=5	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	

子宮がん:(174)AP療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	アクチット注	酢酸リンゲル	500mL1袋	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg	経口	ブリプラチン1時間前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	イメンド80mg	アプレピタント	80mg	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
5	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	アロキシ点滴静注075mg	パロノセトロン	50ml	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	テラルピシン注射用10mg	塩酸ピラルピシン	60mg/m ²	点滴	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%100mL1瓶	点滴	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	ブリプラチン注	シスプラチン	50mg/m ²	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
9	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	150ml	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
10	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
11	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	24時まで	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
12	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	0から6時間	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
12	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	6時間	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
12	YDソリタT1輸液	開始液	500mL1瓶	点滴	6時間かけて24時まで	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-

子宮がん：(248)CPT-11単独(A法3投2休)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg2管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	トポテシン注	塩酸イリノテカン	100mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	テルモ生食	生理食塩液	100mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-