

レジメン名称

[胃:\(3\)TT\(S-1 + パクリタキセル\)療法](#)
[胃:\(4\)S-1 + CDDP療法](#)
 胃:(5)S-1 + CDDP + レンチナン療法
 胃:(6)weekly-パクリタキセル療法
 胃:(7)S-1 + レンチナン療法(臨床試験)
 胃:(38)S-1 + レンチナン療法
 胃:(40)triweekly-パクリタキセル療法A法
[胃:\(66\)CPT-11単独\(B法2投\)療法](#)
[胃:\(66\)CPT-11単独\(B法3投\)療法](#)
[胃:\(126\)CPT-11単独\(A法4投\)療法](#)
[胃:\(126\)CPT-11単独\(A法3投\)療法](#)
[胃:\(132\)tri-weekly-ドセタキセル療法](#)
 胃:(198)CapeOX療法
[胃:\(199\)SOX療法](#)
[胃:\(207\)ラムシルマブ + パクリタキセル療法](#)
[胃:\(210\)ラムシルマブ単独療法](#)
[胃:\(225\)トラスツズマブ + XP療法\(初回\)](#)
[胃:\(225\)トラスツズマブ + XP療法\(2回目以降\)](#)
 胃:(226)SOX + レンチナン療法
 胃:(230)weekly-nab-パクリタキセル療法
[胃:\(235\)ニボルマブ単独療法](#)
[胃:\(237\)ラムシルマブ + nab-パクリタキセル療法](#)
[胃:\(245\)DS\(ドセタキセル + S-1\)併用療法](#)
 胃:(250)トラスツズマブ(3w毎) + カペシタビン療法①
 胃:(250)トラスツズマブ(3w毎) + カペシタビン療法②
[胃:\(309\)トラスツズマブ デルクステカン療法](#)
 胃:(314)SOX+トラスツズマブ療法(初回)
 胃:(314)SOX+トラスツズマブ療法(2回目以降)
[胃:\(315\)CapeOX+トラスツズマブ療法\(初回\)](#)
[胃:\(315\)CapeOX+トラスツズマブ療法\(2回目以降\)](#)
[胃:\(336\)ニボルマブ+SOX療法](#)
[胃:\(337\)ニボルマブ+CapeOX療法](#)
[胃:\(338\)ニボルマブ+m-FOLFOX6\(入院\)療法](#)
[胃:\(339\)ニボルマブ+m-FOLFOX6\(外来\)療法](#)

胃がん: (3)TT(S-1+パクリタキセル)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	レスタミン錠	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg 5錠	経口	タキソール開始30分前	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	グラニセトロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	ファモチジン20mg	ファモチジン	20mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	100mL	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	50mg/m ²	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	S-1	テガフル・ギメランル・オテラシル配合剤	1. 25m2未満 40mg/回 1. 25m2以上 ~1. 5m2未満 50mg/回 1. 5m2以上6 0mg/回	経口	分2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

胃がん: (4)S-1+CDDP療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	ソリューゲンF号	開始液(1)	500mL	点滴メイン	8h(2時間でも可)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	プリンペラン注射液10mg	メクロブラミド	1管	点滴側管	8h	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ソリューゲンF号	開始液(1)	500mL	点滴側管	8h	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ソリューゲンF号	開始液(1)	500mL	点滴メイン	8h	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	デキササート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	2A	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	パロノセロン点滴静注バッグ	パロノセロン	50ml	点滴	全開(15分以内)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	イメンドカプセル	アプレピタント	125mg	経口	CDDP投与60分前	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ランダ注	シスプラチン	60mg/m ²	点滴	2h	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	2h	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ラシックス注20mg	フロセミド	20mg0.5管	点滴側管	2h	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TD-ブクマ-13	維持液(3)	500mL	点滴側管	2h	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	プリンペラン注射液10mg	メクロブラミド	0.5%2mL2管	点滴メイン	8h	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	500mL1袋	点滴メイン	8h	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	イメンドカプセル	アプレピタント	80mg	経口	day9,10	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	デカドロン錠	デキサメタゾン	8mg(16錠)	経口分2	day9,10,11	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤	1. 25m2未満40mg/回 1. 25m2以上~1.5m2未満50mg/回 1. 5m2以上60mg/回	経口	3投2休	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

胃がん(66)CPT-11単独(B法2投)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	グラニセトロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	トボテシン注	塩酸イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

胃がん:(66)CPT-11単独(B法3投)療法

						DAY																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
1	グラニセトロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	トボテシン注	塩酸イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

胃がん:(126)CPT-11単独(A法4投)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	トボテシン注	塩酸イリノテカン	100mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

胃がん:(126)CPT-11単独(A法3投)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	4mg1A	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセトロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	トボテシン注	塩酸イリノテカン	100mg/m ²	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

胃がん：(132)Tri-weekドセタキセル療法

						DAY																															
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg 1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	グラニセロン点滴静注用3mg/バッグ	塩酸グラニセロン	3mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ワンタキソテール注	ドセタキセル水和物	75mg/ml	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	デカドロン錠8mg	デキサメタゾン	8mg2錠分2	経口	朝昼食後	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-

胃がん:(199)SOX療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	パロケチリン点滴静注バッグ	塩酸グラニセトロン	0.75mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	オキサリプラチン射用100mg	オキサリプラチン	100mg/㎡	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1袋	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%30mL1瓶	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合	1.25㎡未満 80mg/日 1.25㎡以上 ~ 1.5㎡未満 100mg/日 1.5㎡以上 120mg/日	経口	分2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

胃がん: (207)ラムシルマブ+パクリタキセル療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg/1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	グラニセロン3mg/50mL	グラニセロン	3mg/50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ファモチジン注	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ポララミン注	クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60分 容性があれば30分まで	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	60分 容性があれば30分まで	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	タキソール注射液30mg	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
6	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	

胃がん：(225)トラスツズマブ+XP療法(初回)

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ポタコールR		500mL	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	プリンペラン	メトクロプラミド	2mL	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	アクチット注	酢酸リンゲル	500mL	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	8mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	イメンドカプセル125	アプレピタント	125mg1錠	経口	シスプラチン開始60分から90分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	イメンドカプセル80	アプレピタント	80mg1錠	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
8	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	パロノセロン点滴静注用バッグ	パロノセロン	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ランダ注	シスプラチン	70mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	300ml	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ポタコールR		500mL1瓶	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
13	アクチット	酢酸リンゲル	500mL1袋	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
13	プリンペラン注2ML	メトクロプラミド	20mL1管	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
14	デキサート注射液	デキサメタゾン	6.6mg	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
14	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-

15	ポタコールR		2mL1A	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
15	ファモチジン 注	ファモチジン	20mg	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
16	アクチット	酢酸リンゲル	500mL1袋	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
17	ゼローダ錠	カペシタビン	2000mg/ 日 1粒	経口	朝夕食 後	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

胃がん：(210)ラムシルマブ単独療法

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	ポララミン注5mgJ	マレイン酸クロルフェニラミン	1mL1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

*:医師の判断で、サイラムザ投与3回目以降の観察時間を削除する場合は、生理食塩液の投与時間を短縮する

胃がん：(225)トラスツズマブ+XP療法(2回目以降)

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ポタコールR		500mL	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	プリンペラン	メクロプロファミド	2mL	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	アクチット注	酢酸リンゲル	500mL	点滴	2時間	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	フック シム	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	8mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	イメンドカプセル125	アプレピタント	125mg1錠	経口	シスプラチン開始60分から90分前	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	イメンドカプセル80	アプレピタント	80mg1錠	経口	午前中	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
8	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	フック シム	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	パロノセトロン点滴静注用バッグ	パロノセトロン	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ランダ注	シスプラチン	70mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	300ml	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ポタコールR		500mL1瓶	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
13	アクチット		500mL1袋	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
13	プリンペラン注2ML	メクロプロファミド	20mL1管	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
14	デキサート注射液	デキサメタゾン	6.6mg	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
14	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
15	ポタコールR		2mL1A	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
15	ファモチジン注	ファモチジン	20mg	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
16	アクチット	酢酸リンゲル	500mL1袋	点滴	6時間	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
17	ゼローダ錠	カペシタビン	2000mg/日分2	経口	朝夕食後	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

胃がん:(235)ニボルマブ療法

						DAY																														
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
1	ポララミン注	マレイン酸アモロルフェニラミ	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

胃がん: (237)ラムシルマブ+nab-パクリタキセル療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg/1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
1	パロノセトン点滴静注バッグ	パロノセトン	0.75mg/50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ファモチジン注	ファモチジン	20mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ポララミン注	クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL1瓶	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	テルモ生食	生理食塩液	100mL1瓶	点滴	1時間かけて	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	アブラキサ注射液30mg	nab-パクリタキセル	100mg/m ²	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	30分	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

胃がん:(245)DS(ドセタキセル+S-1)療法

				DAY																																	
順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
①	S-1	フルオロウラシル+ギメラシル+オテラシルカリウム	1.25m ² 未満 40mg/回 1.25以上~1.5m ² 未満 50mg/回	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②-1	デキサート注射液	デキサメタゾン	3.3mg/1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②-1	パロノセトロン静注用0.75mgバッグ	パロノセトロン	0.75mg/50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②-2	ドセタキセル注	ドセタキセル水和物	40mg/m ²	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②-2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②-3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	フラッシュ	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②-4	S-1	フルオロウラシル+ギメラシル+オテラシルカリウム	1.25m ² 未満 40mg/回 1.25以上~1.5m ² 未満 50mg/回	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
②-5	プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	5mg1錠	経口	夕食後	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②-6	プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	5mg2錠	経口	朝食後	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
③	S-1	フルオロウラシル+ギメラシル+オテラシルカリウム	1.25m ² 未満 40mg/回 1.25以上~1.5m ² 未満 50mg/回	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

* ①3週間1コースを実施後、②3週間を7コース(18週)実施後、③6週間(4投2休)術後1年目まで実施。

胃がん：(250)トラスツズマブ+カペシタビン併用療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	プライミング	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	8mg/kg	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	トラスツズマブ注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	6mg/kg	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	点滴	90-30分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	カペシタビン錠	カペシタビン	2000mg/日	経口	朝夕食後	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

胃がん：(309)トラスツズマブ デルクステカン療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	パロノセトロン点滴静注用	パロノセトロン塩酸塩	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	デキサート注射液	デキサメタゾン	3.3mg/1mL×3	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5%大塚糖液	ブドウ糖	100mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	点滴	* 90-30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5%大塚糖液	ブドウ糖	100mL	点滴	* 90-30分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5%大塚糖液	ブドウ糖	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

*初回90分、忍容性があれば2回目以降は30分に短縮することができる

胃がん: (315)SOX+トラスツズマブ(2回目以降)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	プライミング	●																													
2	大塚生食注	生理食塩液	250mL	点滴	90分→30分	●																													
2	トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴	90分→30分	●																													
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	●																													
4	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●																													
4	パロチロン点滴静注バッグ	塩酸グラニセトロン	0.75mg50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●																													
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●																													
6	オキサリプラチン射用100mg	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴	120分	●																													
6	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1袋	点滴	120分	●																													
7	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●																													
4	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合	1.25m ² 未満 80mg/日 1.25m ² 以上 ~ 1.5m ² 未満 100mg/日 1.50m ² 以上 120mg/日	経口	分2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

胃がん:(336)ニボルマブ+SOX療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ポララミン注	マレイン酸ク ロルフェニラミ ン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	オブジーボ点 滴静注	ニボルマブ	360mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	デキサート注 射液	リン酸デキサ メタゾンナトリ ウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	パロノセロ ン点滴静注 バッグ	パロノセロ ン塩酸塩	0.75mg50 mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	オキサリプラ チン射用 100mg	オキサリプラ チン	100mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1 袋	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1 瓶	点滴	フラッ シュ	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S-1	テガフル・ ギメラシル・ オテラシルカ リウム配合	1.25m ² 未 満 80mg/ 日 1.25m ² 以 上 ~ 1.5 m ² 未満 100mg/日 1.50m ² 以 上	経口	分2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

胃がん:(338)ニボルマブ+m-FOLFOX6(入院)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ポララミン注	マレイン酸クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4	パロノセトロン注射用0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	オキサリプラチン注射用100mg	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	レボホリナート点滴静注用100mg	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
6	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	5-FU注250協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	大塚糖液5%	ブドウ糖	50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	5-FU注250協和	フルオロウラシル	1200mg/m ²	点滴	23h	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
8	大塚生食注	生理食塩液	500mL	点滴	23h	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
9	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	全開(15分以内)	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

胃がん: (338)ニボルマブ+m-FOLFOX6(外来)療法

DAY

順	薬	成分	投与量	ルート	投与時間	DAY																															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
1	ポララミン注	マレイン酸クロルフェニラミン	5mg	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240mg	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
2	テルモ生食	生理食塩液	100mL1袋	点滴	60分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
3	大塚生食注	生理食塩液	50mL1袋	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	デキサート注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム	3.3mg1管	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
4	アロキシシ注射用0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg50mL	点滴	全開(15分以内)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	オキサリプラチン射用100mg	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
5	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	レボホリナート点滴静注用100mg	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
6	大塚糖液5%	ブドウ糖	250mL	点滴	120分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	5-FU注250協和	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
7	大塚糖液5%	ブドウ糖	50mL	点滴	15分	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	5-FU注250協和	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8	大塚生食注	生理食塩液	50mL	点滴	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-